

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!

Üldnarkoosis hambaravi on näidustatud järgmistel juhtudel:

1. Väikelastel
2. Puuetega lastel ja täiskasvanutel
3. Allergia puhul lokaalanesteetikumidele
4. Labiilse närvisüsteemiga inimestel, kes väga kardavad hambaravi
5. Hulgihammaste eemaldamine

Kõik operatsioonid ja valulikud uuringud teostatakse lastel narkoosis. Anestesioloogi ülesandeks on operatsiooni või uuringu ajal valu äravõtmine ja samal ajal lapse organismi elutähtsate funktsioonide (hingamine, vereringe) säilitamine.

Narkoos lülitab välja teadvuse ja valutundlikkuse kogu kehas. Laps on narkoosi algusest kuni lõpuni rahulikus unetaolises seisundis. Enne narkoosi manustatakse lapsele rahustavaid ravimeid suu kaudu, pärasoole kaudu või süstimise teel.

Masknarkoosi puhul hingab laps nina ja suu peale asetatud maski kaudu hapniku ja narkootiliste ainete segu.

Intubatsioonnarkoosi puhul saab laps hapniku ja narkootilise aine segu hingamisteedesse viidud toru kaudu. Lapse veresoonde asetatakse plastkanüül, mille kaudu saab manustada vajalikke ravimeid.

Narkoosi ajal jälgib anestesioloog koos narkoosiõega pidevalt Teie lapse südametegevust, hingamist ning kehatemperatuuri vastavate monitoridelt.

Meie valime narkoosimeetodi, mis on parim eelseisva operatsiooni või uuringu teostamiseks. Tänapäeval on võimalik kasutada erinevaid narkootilisi aineid, vajadusel kasutatakse ka kopsude kunstlikku hingamist. See on oluline selleks, et vältida tüsistusi operatsiooni ajal ja peale narkoosi.

Lapsevanem peab teadma, et ükski operatsioon ja uuring pole riskivaba ning Te saate kaasa aidata sellele, et eelseisev narkoos mööduks ladusalt. Enne narkoosi ei tohi väikesed patsiendid eelnevalt 6 tundi juua ega 6 tundi süüa – see väldib oksendamist ja toidu sattumist hingamisteedesse narkoosi ajal. Enne narkoosi tuleb tühjendada kusepõis.

On oluline, et Te annate meile täpsed andmed oma lapse tervise kohta, see tagab meile eduka koostöö.

Tänades hea koostöö eest Teie lapse tervise huvides

STIGMA ERAKLIINIKU anestesioloogid